

# FERTILIZANTE FOLIAR

## FIXA MZn

Líquido

COMPOSICIÓN (porcentaje peso en peso):

MANGANESO, expresado como Mn ..... 5,4 %

ZINC, expresado como Zn ..... 3,7 %

Solubilidad: Soluble - Densidad a 25° C: 1,29 g/ml - Tensión superficial: 64 dyn/cm

pH: 4,7 (tal cual) a dilución de uso tiende a neutro

SENASA N°: 16.622 Origen: Francia

Contenido neto: 10 litros

### Generalidades:

**Fixa MZn** es un fertilizante líquido, de aplicación foliar en hortalizas, frutales, cítricos y otros cultivos con deficiencias del elemento Zinc. **Fixa MZn** previene y corrige las carencias en Manganeseo y Zinc de los cultivos en los cuales se recomienda, mediante aplicación foliar o vía suelo. **Fixa MZn** garantiza elevados rendimientos y mejora la calidad de los productos (materia seca, calibre, coloración, etc). **Fixa MZn** es un producto líquido con una acción muy suave sobre las hojas y frutos, de gran facilidad de uso y seguridad de empleo para los usuarios.

### Preparación:

**AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR.** Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad, agregar el volumen deseado del fertilizante manteniendo el sistema de agitación en marcha, finalmente, completar el volumen de agua. Enjuagar el envase tres veces, inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar seguro y no contaminante.

En caso de mezcla con otro fitosanitario, efectuar siempre un test previo e incorporar **Fixa MZn** en último lugar, sin dejar de agitar. Una vez preparado el caldo, aplicarlo inmediatamente.

### Indicaciones de uso:

Utilizar un volumen de agua/ha suficiente para obtener una distribución homogénea sobre la superficie de las hojas, sin que gotee. Realizar los tratamientos preferentemente con temperaturas comprendidas entre 6 y 25° C y de acuerdo a las recomendaciones de un INGENIERO AGRÓNOMO.

**PRECAUCIONES GENERALES:** Los abonos que contienen microelementos, se utilizan solo en caso de necesidad reconocida. Se recomienda no sobrepasar las dosis recomendadas.

### Recomendaciones de uso:

| CULTIVO                                             | DOSIS  | CONCENTRACIÓN MÁXIMA | INTERVALOS DE APLICACIÓN                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UTILIZACIÓN COMO FOLIAR</b>                      |        |                      |                                                                                                                                     |
| FRUTALES Y CÍTRICOS<br>(No aplicar sobre Damascos)  | 5 l/ha | 1,5 %                | 2 aplicaciones antes y después de la floración.<br>2 aplicaciones en el estado de cuajado del fruto.                                |
| HORTALIZAS*<br><br>OTROS DEFICIENCIAS DE ZINC       |        |                      | 1 – 2 aplicaciones cuando la planta tenga suficiente masa foliar para recibir el tratamiento en los periodos de máximo crecimiento. |
| <b>UTILIZACIÓN APLICADO AL SUELO</b>                |        |                      |                                                                                                                                     |
| 5 – 10 l/ha según el nivel de rectificación deseado |        |                      |                                                                                                                                     |

\*Para cultivos desconocidos o bajo cubierta realizar un test previo a la concentración de 0,5 % y observar su comportamiento.

### Condiciones de almacenamiento:

Mantener siempre en el envase original bien cerrado y en depósitos ventilados, cubiertos y al resguardo del frío, sin exposición directa al sol. Mantener el depósito cerrado con llave o candado, fuera del alcance de los niños y con acceso solo para personas autorizadas. No transportar ni almacenar con alimentos, bebidas, forrajes o ropas.

### Observaciones:

- No pulverizar si está lloviendo.
- No pulverizar bajo condiciones de stress.
- No dejar la solución preparada más de 6 horas o durante la noche.

“ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMÚN INCORPORADOS AL SUELO”

“SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR (0,5 % AL 1 %) O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS”

Es un producto de:



**DE SANGOSSE**  
LATIN AMERICA S.A.

Lima 369, 10° H (C1073AAG), CABA, Argentina Tel: (54 11) 5217-4278

Fabricado por:

AGRONUTRITION, Parc Activestre – 3 avenue de l'Orchidée – 31390 Carbonne, Francia