FERTILIZANTE FOLIAR

BOROZINC

Líquido

COMPOSICIÓN (porcentaje peso en peso):

BORO soluble en ácido, expresado como B ..... 11,7 %
ZINC, expresado como Zn ..... 3,8 %

Solubilidad: Soluble - Tensión superficial: 66,8 dyn/cm
pH: 3,9 (tal cual) a dilución de uso tiende a neutro

SENASA Nº: 16.593 Origen: Francia

Contenido neto: 10 litros

Generalidades:

Borozinc es un fertilizante en polvo, de aplicación foliar en frutales de carozo y pepita, vid, olivo, hortalizas y eventualmente en cultivos extensivos de girasol y maíz, que previene las carencias de Boro y Zinc en los mencionados cultivos. **Borozinc** está especialmente indicado para frutales sensibles a la carencia de ambos elementos. **Borozinc** es un producto cuya fórmula suave permite ser utilizada en períodos sensibles de aplicación, períodos que se corresponden con un fuerte crecimiento de las plantas y aumento de sus necesidades nutricionales.

Características de la formulación: Acomplejante y tamponadora. Penetración óptima y rápida de los elementos. Tasa de absorción próxima al 100%. Mejor afinidad de la mezcla ácida con la cutícula vegetal. Previene la precipitación de los elementos con el calcio del agua (insolubilización). Compatible con la mayor parte de los productos fitosanitarios. Acidificador y estabilizador de pH (poder tampón). Solubilidad de los elementos nutritivos presentes en las hojas. Particularmente recomendado en caso de aguas duras y/o calcáreas.

Preparación:

AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad, agregar el volumen deseado del fertilizante manteniendo el sistema de agitación en marcha, finalmente, completar el volumen de agua. Enjuagar el envase tres veces, inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar seguro y no contaminante.

En caso de mezcla con otro fitosanitario, efectuar siempre un test previo e incorporar **Borozinc** en último lugar, sin dejar de agitar. Una vez preparado el caldo, aplicarlo inmediatamente.

Indicaciones de uso:

Utilizar un volumen de agua/ha suficiente para obtener una distribución homogénea sobre la superficie de las hojas, sin que gotee. Realizar los tratamientos preferentemente con temperaturas comprendidas entre 6 y 25^0 C y de acuerdo a las recomendaciones de un **INGENIERO AGRÓNOMO.**

PRECAUCIONES GENERALES: Los abonos que contienen microelementos, se utilizan solo en caso de necesidad reconocida. Se recomienda no sobrepasar las dosis recomendadas.

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	DOSIS Kg/ Ha	CONC. MÁXIMA	INTERVALOS DE APLICACIÓN
FRUTALES DE CAROZO Y PEPITA	2 Kg / Ha	1 %	A aparición de los botones florales. A sépalos visibles. A principio de floración. A caída de pétalos. A cuajado de frutos.
	4 Kg / Ha	2 %	Aplicación de otoño: a las 2 a 3 semanas después de la recolección, antes de la caída de las hojas o sobre la madera
VIÑA Y OLIVO APLICACIONES DE OTOÑO	2 Kg / Ha	0,5 %	A racimos visibles. A botones florales. En post floración.
	2 Kg / Ha	2 %	Aplicación de otoño: después de la vendimia o sobre la madera.
MAÍZ Y GIRASOL	3 Kg / Ha	1 %	1 a 2 aplicaciones sobre hojas suficientemente desarrolladas.
HORTALIZAS*	3 Kg / Ha	0,5 %	

*Para cultivos desconocidos o bajo cubierta realizar un test previo a la concentración de 1 % y observar su comportamiento.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener siempre en el envase original bien cerrado y en depósitos ventilados, cubiertos y al resguardo del frío, sin exposición directa al sol. Mantener el depósito cerrado con llave o candado, fuera del alcance de los niños y con acceso solo para personas autorizadas. No transportar ni almacenar con alimentos, bebidas, forrajes o ropas.

Observaciones:

- No pulverizar si está lloviendo.
- No pulverizar bajo condiciones de stress.
- No dejar la solución preparada más de 6 horas o durante la noche.

"ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMÚN INCORPORADOS AL SUELO"

"SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO IÓNICO, NO POLAR (0,5 % AL 1 %) O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS"

Es un producto de:

DE SANGOSSE
LATIN AMERICA S.A.
Lima 369, 10º H (C1073AAG), CABA, Argentina Tel: (54 11) 5217-4278

Fabricado por:
AGRONUTRITION, Parc Activestre – 3 avenue de l'Orchidée – 31390 Carbonne, Francia